

Mapas bioclimáticos de la Argentina para el período 1981-2010

Maio, S., L. Calabrese y L. B. Spescha

Revista Argentina de Agrometeorología RADA, v. XII (2021): 73–79

Resumen

Se definieron áreas geográficas teniendo en cuenta los tipos bioclimáticos correspondientes al sentir climático de un hombre en la sombra y sin viento, en reposo o en actividad sedentaria y vestido con ropa liviana. El objetivo de este trabajo fue efectuar una zonificación bioclimática obtenida a través del estudio de las condiciones ambientales estivales e invernales ya que las mismas ofrecen valiosa aplicación en las diversas actividades humanas. Se utilizó la información meteorológica diaria del SMN y del INTA de 133 estaciones para el período 1981-2010 a partir de la cual se calcularon los tipos bioclimáticos de Hoffmann y Medina, 1971. Se observaron diferencias en las regiones actualizadas al ser comparadas con los tipos bioclimáticos del período 1950-1980. En verano, en el centro norte del país predomina el área geográfica del tipo bioclimático 6, cálido. En invierno la región centro norte se encuentra entre templado y frío moderado. Solo en una región existe el muy frío en la estación invernal, localizada en el sur del país.

Palabras clave: Tipos bioclimáticos; verano; invierno